

**TUSSENKOMST DEXA-BOTMETING (>01.08.2010)**

**Betreft patiënt:**

**Criteria tussenkomst (1 keer per 5 jaar)**

(duidt aan wat van toepassing is)

Groep 1	<b>vrouwen &gt; 65jr met geschiedenis van osteoporose</b> , namelijk heupfractuur bij familie van 1 <sup>ste</sup> of 2 <sup>de</sup> graad	
Groep 2	ongeacht leeftijd of geslacht, indien <b>één of meer van volgende risicofactoren</b> aanwezig zijn	
	- niet oncologische low impact fractuur	
	- antecedenten van low impact fractuur (excl vingers, tenen, schedel, gelaat, CWZ)	
	- corticotherapie >3mnd à equivalent >7,5mg prednisolone/dag	
	- oncologische pt onder anti-hormonale therapie of in menopauze tgv oncologische therapie	
	- minstens één van volgende risicofactoren	
	- rheumatoïde artritis	
	- evolutieve niet behandelde hyperthyreoidie	
	- hyperprolactinemie	
	- langdurig hypogonadisme (ook post therapie)	
	- renale hypercalciurie	
	- primaire hyperparathyreoidie	
	- osteogenesis imperfecta	
	- ziekte/Syndroom v Cushing	
	- anorexia Nervosa BMI <19kg/m <sup>2</sup>	
	- vroegtijdige menopauze (<45jr)	

**Klinische risicovariabelen**

(vul in en duidt aan)

Exacte leeftijd		
Gewicht		
Lengte		
Geslacht	Man	Vrouw
Vroegere fracturen?	Ja	Neen
Heupfractuur bij verwanten tot 2de graad?	Ja	Neen
Roken?	Ja	Neen
Gebruik corticoiden?	Ja	Neen
Rheumatoïde artritis?	Ja	Neen
Secundaire osteoporose?	Ja	Neen
Gebruik van >3 eenheden alcohol per dag?	Ja	Neen

Arts die gegevens verstrekt:  
(stempel + handtek. + datum)